

Proteggi i tuoi figli dall'RSV

PER GENITORI E FUTURI GENITORI

Che cos'è l'RSV?

Il Virus Respiratorio Sinciziale (*Respiratory syncytial virus*, RSV) causa una malattia respiratoria che colpisce le vie aeree e i polmoni, specialmente nei bebè e nei bambini.

L'RSV causa spesso sintomi simili al raffreddore ed è la causa più comune di un'infezione chiamata bronchiolite. Bebè e bambini spesso sviluppano la malattia da RSV in forma leggera e guariscono rapidamente. Tuttavia, alcuni di essi possono sviluppare un'infezione più grave e potenzialmente letale che richiede il ricovero ospedaliero.

Quasi tutti i bambini contraggono l'RSV prima dei due anni, e questa è la principale causa di ricovero ospedaliero in questo gruppo d'età.

L'RSV si diffonde facilmente ed è attivo in particolare dal tardo autunno all'inizio della primavera. Voi e i vostri figli potete contrarre l'RSV via contatto diretto con persone infette o superfici contaminate dall'RSV. È possibile contrarlo anche semplicemente in presenza di qualcuno infetto dall'RCV che tossisca o starnutisca.



Quali sono i sintomi dell'RSV?

I sintomi dell'RSV sono simili a quelli del raffreddore o dell'influenza. Possono comprendere:



Tosse



Naso che cola



Febbre



Rantolo



Riduzione
dell'appetito
o della sete



Scarsa energia
o forte senso di
affaticamento



Capricciosità
o irritabilità



Se i vostri figli faticano a respirare, sono disidratati e/o i loro sintomi si aggravano, rivolgetevi al medico.

Che cosa posso fare per proteggere i miei figli dall'RSV?

Esistono modi per evitare che i vostri figli contraggano un'infezione da RSV. Tra questi:



Un farmaco anticorpale preventivo somministrato ai bambini



Un vaccino somministrato in gravidanza

Entrambe le opzioni sono sicure ed efficaci. Basta una delle due a proteggere i bambini dall'RSV. Non è necessario usare sia il farmaco sia il vaccino, salvo ove raccomandato da un medico.

La Commissione Consultiva Nazionale sulle Immunizzazioni (*National Advisory Committee on Immunization*, NACI) del Canada raccomanda il farmaco anticorpale preventivo somministrato ai bambini come protezione preferenziale contro l'infezione da RSV anziché il vaccino somministrato in gravidanza. Tale raccomandazione si basa sull'efficacia del farmaco anticorpale preventivo, sulla durata della protezione fornita e sul suo livello di sicurezza.

Il Beyfortus™ (noto anche col nome di nirsevimab) è il farmaco anticorpale preventivo raccomandato.

Non si tratta di un vaccino. Beyfortus agisce come gli anticorpi generati dal nostro corpo. Tali anticorpi ci aiutano a sbarazzarci di germi e sostanze nocive.



I miei figli hanno diritto a ricevere il Beyfortus?

I vostri figli possono ricevere il Beyfortus durante la stagione dell'RSV in Ontario se:

- ✓ Sono nati dal 1° aprile in poi e hanno meno di otto mesi fino al termine della stagione dell'RSV
- ✓ Hanno meno di due anni d'età e sono a rischio di forma grave della malattia da RSV nella loro seconda stagione dell'RSV*

La stagione dell'RSV solitamente va da novembre a fine marzo ma può variare di anno in anno e dipendere da dove vi trovate in Ontario.

*Questo comprende ma non si limita a bambini con malattia polmonare cronica da prematurità (displasia broncopolmonare), cardiopatia congenita, immunodeficienza grave, sindrome di Down, fibrosi cistica, malattia neuromuscolare, anomalie congenite delle vie aeree.



Il Beyfortus è sicuro?

Sì. I trial clinici hanno dimostrato che il **Beyfortus è sicuro per bebè e bambini**. Il Beyfortus previene anche le malattie correlate all'RSV come la bronchiolite e le infezioni gravi da RSV.

Gli effetti collaterali dopo la somministrazione del Beyfortus sono solitamente leggeri e di breve durata. Tra questi possono rientrare arrossamento, gonfiore e indolenzimento del punto d'iniezione, eruzioni cutanee e/o febbre.

Il Beyfortus si può somministrare in sicurezza anche simultaneamente ad altre immunizzazioni.

Ricevere il Beyfortus non farà contrarre l'RSV ai bambini. Raramente, è possibile ammalarsi gravemente di RSV anche se si è ricevuto il Beyfortus.



Come si somministra il Beyfortus ai bambini?

Il Beyfortus si somministra ai bambini sotto forma di una sola iniezione (spesso nel muscolo della coscia). Il trattamento immunizza contro l'RSV dal momento stesso della somministrazione ed è più efficace nei primi **cinque mesi** dalla somministrazione.



Quando possono ricevere il Beyfortus i miei figli?

- ✓ Per i nati durante la stagione dell'RSV, si raccomanda di somministrare il Beyfortus poco dopo la nascita. Ciò offrirà protezione nei primi mesi, quando i bebè sono più vulnerabili.
- ✓ Per i nati prima della stagione dell'RSV e che hanno otto mesi o meno, si raccomanda di somministrare loro il Beyfortus poco prima dell'inizio della stagione dell'RSV.
- ✓ Per i bambini ad alto rischio di infezione da RSV e che si avvicinano alla seconda stagione dell'RSV, si raccomanda di somministrare loro il Beyfortus poco prima dell'inizio della stagione dell'RSV.

Se i vostri figli hanno mancato tali scadenze, possono comunque ricevere il Beyfortus in qualsiasi momento della stagione dell'RSV.



Quando posso far somministrare il Beyfortus ai miei figli?

Si raccomanda che i neonati ricevano il Beyfortus in ospedale prima della dimissione successiva al parto. Altrimenti, il Beyfortus può anche essere somministrato ai bebè dalla levatrice, dal medico di famiglia o presso l'unità sanitaria locale. Per i bambini aventi diritto, il Beyfortus può essere somministrato presso l'ambulatorio del pediatra o medico di famiglia, oltre che presso cliniche ospedaliere per non degenti.

Abrysvo™ (noto anche sol nome di RSVpreF) è un vaccino che può essere somministrato in gravidanza per prevenire le infezioni da RSV nei nati.

- ✓ Va somministrato tra le **32 e 36 settimane di gravidanza** se la data prevista per il parto cade vicino all'inizio della stagione dell'RSV.
- ✓ Il vaccino aiuta il sistema immunitario della persona in gravidanza a produrre anticorpi che passano nei figli nel corso della gravidanza. Tali anticorpi **proteggeranno i bebè dalle infezioni da RSV** per i primi mesi di vita, solitamente fino a sei mesi.



Parlate col vostro medico o con l'unità sanitaria locale per maggiori informazioni.

Che cos'altro posso fare per proteggermi dall'RSV?



Restate in casa quando siete malati ed evitate i contatti ravvicinati con i malati



Lavatevi spesso le mani



Pulite e disinfettate regolarmente le superfici



Tossite o starnutite nell'incavo del gomito



Allattate i bebè al seno (il latte materno contiene anticorpi protettivi)



Evitate il fumo

Questa scheda contiene solamente informazioni generali e non sostituisce pareri, diagnosi o prescrizioni mediche. Discutete le vostre scelte col vostro medico e decidete un piano adatto alle esigenze vostre e della vostra famiglia per proteggere i vostri bambini durante la stagione dell'RSV.

Per maggiori informazioni, visitate il sito sull'RSV del **Ministero della Salute dell'Ontario**: Ontario.ca/RSV

Questa scheda informativa è disponibile in altre lingue. Per vederle, scansionate il codice QR.

